arXiv:1003.3172v1 [math.SP] 16 Mar 2010

О собственных функциях оператора Штурма–Лиувилля с потенциалами из пространств Соболева

[1]

Савчук А. М.

В работе изучается оператор Штурма–Лиувилля L в пространстве $L_2[0,\pi]$, порождённый дифференциальным выражением $l(y) = -y'' + q(x)y$ и краевыми условиями Дирихле $y(0) = y(\pi) = 0$. Потенциал $q \in W_2^{-1}[0,\pi]$ предполагается комплекснозначным (здесь $W_2^{-1}[0,\pi]$ — пространство Соболева). Операторы такого вида были определены в работе [1] и подробно изучены в работах [1]–[3]. В частности, было доказано, что спектр L чисто дискретен и были получены асимптотические формулы для собственных значений и собственных функций. При этом в формулах для собственных значений были выписаны два асимптотических члена, а для собственных функций был найден только главный член асимптотики. Цель настоящей работы — получить второй член в асимптотике собственных функций. Интерес к такого рода оценкам вызван недавними работами И.В.Садовничей [4], где эти результаты используются в теоремах о равносходимости.

Нам потребуются некоторые обозначения и утверждения, доказанные в работе [2]. Мы обозначим через $u(x)$ — обобщённую первообразную функции q (она определена с точностью до константы), $u_{\mathcal{R}} = \operatorname{Re} u$, $u_{\mathcal{I}} = \operatorname{Im} u$. Обозначим также

$$b(x,\lambda) := \int_0^x u(t)\sin(2\lambda^{1/2}t)\,dt, \quad a(x,\lambda) := \int_0^x u(t)\cos(2\lambda^{1/2}t)\,dt,$$

$$B(x,\lambda) := \int_0^x u^2(t)\sin(2\lambda^{1/2}t)\,dt, \quad A(x,\lambda) := \int_0^x u^2(t)\cos(2\lambda^{1/2}t)\,dt,$$

$$U(x) := \int_0^x u^2(t)\,dt, \quad \mathrm{w}(x,\lambda) := \int_0^x\int_0^t u(t)u(s)\cos(2\lambda^{1/2}t)\sin(2\lambda^{1/2}s)\,ds\,dt,$$

$$\upsilon(x,\lambda) := b(x,\lambda) + \frac{1}{2}\lambda^{-1/2}U(x) + 2\,\mathrm{w}(x,\lambda) - \frac{1}{2}\lambda^{-1/2}A(x,\lambda),$$

$$\Upsilon(\lambda) := \sup_{0\leqslant x\leqslant\pi}\left(|b(x,\lambda)| + |a(x,\lambda)| + 2|\,\mathrm{w}(x,\lambda)| + \frac{1}{2}|\lambda^{-1/2}A(x,\lambda)|\right) + |\lambda|^{-1/2}\|u\|_{L_2}^2,$$

$$a(x,n^2) = a_{2n}(x), \quad b(x,n^2) = b_{2n}(x),$$

$$A(x,n^2) = A_{2n}(x), \quad B(x,n^2) = B_{2n}(x),$$

$$\mathrm{w}(x,n^2) = \mathrm{w}_{2n}(x), \quad \upsilon(x,n^2) = \upsilon_{2n}(x),$$

$$b_n := \int_0^\pi u(t)\sin(nt)\,dt, \quad a_n := \int_0^\pi u(t)\cos(nt)\,dt,$$

---

[1] Работа поддержана грантом РФФИ No. 09-01-90408

$$A_n := \int\limits_0^\pi u^2(t)\cos(nt)dt, \quad B_n := \int\limits_0^\pi u^2(t)\sin(nt)dt,$$

$$\mathrm{w}_n := \int\limits_0^\pi \int\limits_0^t u(t)u(s)\cos(2nt)\sin(2ns)dsdt, \quad U(\pi) = \int\limits_0^\pi u^2(t)dt,$$

$$\mu_n := -\frac{1}{\pi}\upsilon(\pi, n^2) = -\frac{1}{\pi}\upsilon_{2n}(\pi) = -\frac{1}{\pi}\int\limits_0^\pi u(t)\sin(2nt)dt + \frac{1}{2\pi n}\int\limits_0^\pi u^2(t)\cos(2nt)dt -$$

$$-\frac{2}{\pi}\int\limits_0^\pi \int\limits_0^t u(t)u(s)\cos(2nt)\sin(2ns)dsdt - \frac{1}{2\pi n}\int\limits_0^\pi u^2(t)dt =$$

$$= -\frac{1}{\pi}b_{2n} + \frac{1}{2\pi n}A_{2n} - \frac{2}{\pi}\,\mathrm{w}_{2n} - \frac{1}{2\pi n}U(\pi).$$

Далее мы будем проводить оценки в комплексной λ–плоскости внутри областей, ограниченных параболами

$$P_\alpha = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \ \mathrm{Re}\,\lambda > 1, \ |\,\mathrm{Im}\,\sqrt{\lambda}| < \alpha\},$$

а в z–плоскости $(z = \sqrt{\lambda})$ внутри полуполос

$$\Pi_\alpha = \{z \in \mathbb{C} \mid \ \mathrm{Re}\,z > 1, \ |\,\mathrm{Im}\,z| < \alpha\}.$$

Всюду далее, рассматривая функцию $z = \sqrt{\lambda}$, подразумеваем выбор её главной ветви, принимающей положительные значения при $\lambda > 0$.

Введённые выше функции будут участвовать в асимптотиках решений, причём $\Upsilon^2(\lambda)$ будет служить для оценки остатков. Функцию $\Upsilon(\lambda)$ можно заменить более простым выражением

$$\Upsilon_1(\lambda) = \sup_{0 \leqslant x \leqslant \pi} (|b(x,\lambda)| + |a(x,\lambda)|) + |\lambda|^{-1/2}\|u\|^2_{L_2},$$

так как внутри парабол P_α легко получить оценку

$$\Upsilon_1(\lambda) \leqslant \Upsilon(\lambda) \leqslant M\Upsilon_1(\lambda),$$

где $M = 2\sqrt{\pi}(1 + \|u\|_{L_2})\mathrm{ch}(2\pi\alpha)$.

Представим основные результаты о спектре оператора L.

Утверждение 1. *(см.* [2, Теорема 1.5]*) Оператор L имеет непустое резольвентное множество и спектр его дискретен.*

Обозначим через $\omega(x,\lambda)$ решение дифференциального уравнения $-\omega'' + q\omega = \lambda\omega$ с начальными условиями $\omega(0,\lambda) = 0$, $\omega^{[1]}(0,\lambda) = 1$ (здесь $\omega^{[1]} = \omega' - u\omega$ — первая квазипроизводная). Ясно, что нули целой функции $\omega(\pi,\lambda)$ совпадают с собственными значениями оператора L. В силу теоремы существования и единственности, геометрическая кратность каждого собственного значения равна 1. В случае вещественного потенциала присоединенные функции отсутствуют, т.е. все собственные значения являются простыми, но в общем случае это не так. Обозначим через $\{\mu_k\}_1^\infty$ все нули функции $\omega(\pi,\lambda)$ *без учета кратности* (т.е. $\mu_j = \mu_k$ только при $j = k$), причем нумерацию будем вести в порядке возрастания модуля, а в случае совпадения модулей — по возрастанию аргумента, значения которого выбираются из полуинтервала $(-\pi, \pi]$. Цепочкой из собственной и присоединенных функций, отвечающей собственному значению μ_k, называют систему функций $\{y_k^0,\, y_k^1,\, \ldots,\, y_k^{p_k-1}\}$, где $(L - \mu_k I)y_k^0 = 0$, $(L - \mu_k I)y_k^j = y_k^{j-1}$ для всех $j = 1, \ldots, p_k - 1$. Присоединенные функции определены неоднозначно и, следуя работе [5], *канонической цепочкой* назовем любую из цепочек, имеющих максимальную длину. Длину канонической цепочки (число p_k) назовем *алгебраической кратностью* собственного значения μ_k. В нашем случае каноническую цепочку можно предъявить явно, что мы сейчас и проделаем.

Пусть μ_k — ноль функции $\omega(\pi, \lambda)$ кратности q_k. Заметим, что функции $\omega_\lambda^{(j)}(x, \lambda)$, $j = 1, 2, \ldots, q_k - 1$ удовлетворяют дифференциальным уравнениям $l(\omega_\lambda^{(j)}) = \lambda\omega_\lambda^{(j)} + \omega_\lambda^{(j-1)}$, причем $\omega_\lambda^{(j)}(0, \lambda) \equiv 0$. Кроме того, $\omega_\lambda^{(j)}(\pi, \mu_k) = 0$, поскольку μ_k есть ноль кратности q_k. Таким образом, функции $\omega_\lambda^{(j)}(x, \mu_k)$, $j = 0, 1, \ldots, q_k - 1$ образуют цепочку из собственной и присоединенных функций, отвечающую собственному значению μ_k. Как и любая цепочка из собственной и присоединенных функций, эта система линейно независима, а значит, порождает подпространство размерности q_k. Теперь остается отметить (см. [6, Гл. I, п.3]), что эта цепочка является канонической, т.е. имеет максимальную длину ($p_k = q_k$).

Нам будет удобно ввести и другую нумерацию собственных и присоединенных функций. Под системой собственных и присоединенных функций $\{y_n(x)\}_{n=1}^\infty$ мы будем везде далее понимать систему $\bigcup\limits_{k=1}^\infty \left\{ \frac{\omega_\lambda^{(j)}(\cdot, \mu_k)}{\|\omega(\cdot, \mu_k)\|_{L_2}} \right\}_{j=0}^{q_k-1}$ (таким образом, $\|y_n\|_{L_2} = 1$, если y_n — собственная функция). Через $\{\lambda_n\}_{n=1}^\infty$ обозначим нули функции $\omega(\pi, \lambda)$ в порядке возрастания модуля *с учетом кратности* (тогда $Ly_n = \lambda_n y_n$ для любого $n \in \mathbb{N}$).

Построим теперь биортогональную систему $\{\mathrm{v}_n\}_{n=1}^\infty$ к системе $\{y_n\}_{n=1}^\infty$. Прежде всего заметим, что при любом k система $\{z_k^j\}_{j=0}^{q_k-1}$, где $z_k^j(x) = \overline{\omega_\lambda^j(x, \mu_k)}$, является системой из собственной и присоединенных функций для оператора $L^* = -\frac{d^2}{dx^2} + \overline{q}$, отвечающей собственному значению $\overline{\mu_k}$. Покажем теперь, как с помощью конечных линейных комбинаций системы $\bigcup\limits_{k=1}^\infty \{z_k^j\}_{j=0}^{q_k-1}$ построить биортогональную к $\{y_n\}_1^\infty$ систему. Заметим, что если функция z лежит в корневом подпространстве оператора L^*, отвечающем собственному значению $\overline{\mu_l}$, а функция y — в корневом подпространстве оператора L, отвечающем собственному значению μ_k, где $k \neq l$, то функции y и z ортогональны. Действительно, для собственных функций $\mu_k(y, z) = (Ly, z) = (y, L^*z) = \mu_l(y, z)$, т.е. $(y, z) = 0$. Если теперь y — первая присоединенная функция, а z — собственная функция, то, учитывая, что ортогональность собственных функций уже доказана, $\mu_k(y, z) = (Ly, z) = (y, L^*z) = \mu_l(y, z)$. Дальнейшее очевидно. Таким образом, достаточно построить биортогональную систему в каждом корневом подпространстве по отдельности. В случае простого собственного значения это легко: $\mathrm{v}_n(x) = \overline{y_n(x)}/(y_n(x), \overline{y_n(x)})$. Знаменатель здесь отличен от нуля, так как интегрированием по частям легко получить равенство $\int\limits_0^\pi \omega^2(x, \mu_k)dx = \omega'_\lambda(\pi, \mu_k)\omega'_x(\pi, \mu_k)$. Для собственных значений кратности $p_k > 1$ мы сошлемся на [7, Гл. 1, §3]:

Утверждение 2.

$$(z_k^j, \omega_k^i) = \begin{cases} 0, & i + j < p_k - 1, \\ a_k^{i+j}, & i + j \geqslant p_k - 1, \end{cases}$$

причем $a_k^{p_k-1} \neq 0$.

Тогда элементы биортогональной системы имеют вид

$$\mathrm{v}_k^{p_k-j}(x) = b_k^{j-1} z_k^0(x) + b_k^{j-2} z_k^1(x) + \cdots + b_k^0 z_k^{j-1}(x),$$

где $b_k^0 = \dfrac{1}{a_k^{p_k-1}}$, $b_k^1 = -\dfrac{b_k^0 a_k^{p_k}}{a_k^{p_k-1}}$, $b_k^2 = -\dfrac{b_k^1 a_k^{p_k} + b_k^0 a_k^{p_k+1}}{a_k^{p_k-1}}, \ldots,$

$$b_k^{p_k-1} = -\frac{b_k^{p_k-2} a_k^{p_k} + b_k^{p_k-3} a_k^{p_k+1} + \cdots + b_k^0 a_k^{2p_k-2}}{a_k^{p_k-1}}.$$

Следуя работе [2] функцию $\omega(x,\lambda)$ будем искать в виде $\omega(x,\lambda) = r(x,\lambda)\sin\theta(x,\lambda)$.

Утверждение 3. *Функции* $\theta(x,\lambda)$ *и* $r(x,\lambda)$ *удовлетворяют системе уравнений*

$$\begin{cases} \theta'(x,\lambda) = \lambda^{\frac{1}{2}} + \lambda^{-\frac{1}{2}} u^2(x)\sin^2\theta(x,\lambda) + u(x)\sin 2\theta(x,\lambda), \\ r'(x,\lambda) = -r(x,\lambda)\left[u(x)\cos 2\theta(x,\lambda) + \frac{1}{2}\lambda^{-1/2} u^2(x)\sin 2\theta(x,\lambda)\right]. \end{cases} \tag{1}$$

Утверждение 4. *(см.* [2, Лемма 2.1]*) Пусть* $\alpha > 0$ *— произвольное фиксированное число,* P_α *— область, ограниченная параболой* $|\operatorname{Im}\sqrt{\lambda}| < \alpha$*. Тогда существует число* μ *(зависящее только от функции* u *и* α*) такое, что при любых* $\lambda \in P_\alpha$, $\operatorname{Re}\lambda > \mu$*, первое уравнение системы* (1) *имеет единственное решение* $\theta(x,\lambda)$*, определённое при всех* $0 \leqslant x \leqslant \pi$ *и удовлетворяющее начальному условию* $\theta(0,\lambda) = 0$*. Это решение допускает представление*

$$\theta(x,\lambda) = \lambda^{1/2} x + b(x,\lambda) + \frac{1}{2}\lambda^{-1/2} U(x) + 2\,\mathrm{w}(x,\lambda) - \frac{1}{2}\lambda^{-1/2} A(x,\lambda) + \rho(x,\lambda), \tag{2}$$

где

$$|\rho(x,\lambda)| \leqslant M\Upsilon^2(\lambda), \quad \lambda \in P_\lambda, \quad \operatorname{Re}\lambda > \mu,$$

причём выбор постоянной M *зависит от* u *и* α*, но не зависит от* x, λ.

Утверждение 5. *(см.* [2, Лемма 2.2]*) Пусть* $\alpha > 0$ *— произвольное фиксированное число, а* P_α *— область, ограниченная параболой* $|\operatorname{Im}\sqrt{\lambda}| < \alpha$*. Пусть* $\theta(x,\lambda)$ *— решение первого уравнения системы* (1) *с начальным условием* $\theta(0,\lambda) = 0$*. Тогда решение* $r(x,\lambda)$ *второго уравнения системы* (1) *с начальным условием* $r(0,\lambda) = 1$ *допускает представление*

$$r(x,\lambda) = 1 - a(x,\lambda) - \frac{1}{2}\lambda^{-1/2} B(x,\lambda) + \rho(x,\lambda) \quad \lambda \in P_\alpha,\ \operatorname{Re}\lambda > \mu, \tag{3}$$

где

$$|\rho(x,\lambda)| \leqslant M\Upsilon^2(\lambda).$$

Здесь μ *и* M *— числа, зависящее только от* α *и* $u(x)$*.*

Представим основные результаты о спектре оператора L.

Утверждение 6. *(см.* [2, Теорема 3.1]*) Пусть* $\{\lambda_n\}_1^\infty$ *— собственные значения оператора* L*, занумерованные в порядке возрастания модуля с учётом алгебраической кратности. Тогда*

$$\lambda_n^{1/2} = n + \mu_n + \rho_n, \quad \text{где } |\rho_n| \leqslant M\Upsilon^2(\lambda_n), \tag{4}$$

причем выбор постоянной M *зависит от* u*, но не зависит от* n.

Утверждение 7. *(см.* [2, Лемма 2.3] *Пусть несгущающаяся последовательность комплексных чисел $\{z_n\}$ лежит в полосе $|\operatorname{Im} z| < \alpha$, где $\alpha > 0$ — произвольное число. Пусть оператор $T_x:\ L_2[0,\pi] \to l_2$ определён равенством*

$$T_x f = \{c_n\}_{n=1}^{\infty}, \quad \text{где } c_n = \int\limits_0^x f(t) e^{iz_n t}dt.$$

Тогда $\|T_x\| \leqslant M$ для некоторой постоянной M, зависящей от последовательности $\{z_n\}$, но не зависящей от $x \in [0,\pi]$.

Таким образом, согласно утверждениям 5 – 7, собственные значения $\{\lambda_n\}_1^{\infty}$ оператора L подчинены асимптотике

$$\lambda_n^{1/2} = n + \mu_n + \rho_n, \quad \text{где } \{\rho_n\}_1^{\infty} \in l_1. \tag{5}$$

Перейдём к результатам о системе собственных и присоединённых функций.

Теорема 1. *Начиная с некоторого номера все собственные значения однократны, а нормированные собственные функции имеют вид*

$$y_n(x) = \frac{\omega(x,\lambda_n)}{\|\omega(x,\lambda_n)\|} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin(nx)\left(1 + \frac{1}{\pi}\int\limits_0^{\pi}(\pi - t)u_{\mathcal{R}}(t)\cos(2nt)dt + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{2\pi n}\int\limits_0^{\pi}(\pi - t)(u_{\mathcal{R}}^2(t) - u_{\mathcal{I}}^2(t))\sin(2nt)dt - \int\limits_0^x u(t)\cos(2nt)dt - \frac{1}{2n}\int\limits_0^x u^2(t)\sin(2nt)dt\right) +$$

$$+\sqrt{\frac{2}{\pi}}x\cos(nx)\left(-\frac{1}{\pi}\int\limits_0^{\pi}u(t)\sin(2nt)dt + \frac{1}{2\pi n}\int\limits_0^{\pi}u^2(t)\cos(2nt)dt - \right. \tag{6}$$

$$\left. -\frac{2}{\pi}\int\limits_0^{\pi}\int\limits_0^{t}u(t)u(s)\cos(2nt)\sin(2ns)dsdt - \frac{1}{2\pi n}\int\limits_0^{\pi}u^2(t)dt\right) +$$

$$+\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cos(nx)\left(\int\limits_0^x u(t)\sin(2nt)dt + \frac{1}{2n}\int\limits_0^x u^2(t)dt - \frac{1}{2n}\int\limits_0^x u^2(t)\cos(2nt)dt + \right.$$

$$\left. +2\int\limits_0^x\int\limits_0^t u(t)u(s)\cos(2nt)\sin(2ns)dsdt\right) + \rho_n(x), \quad \text{где } \{\|\rho_n(x)\|_{C[0,\pi]}\}_1^{\infty} \in l_1.$$

Соответствующие функции биортогональной системы имеют вид

$$
\begin{aligned}
\mathrm{v}_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin(nx)\Bigg(1+\frac{1}{\pi}\int\limits_0^\pi(\pi-t)(u_{\mathcal{R}}(t)+2iu_{\mathcal{I}}(t))\cos(2nt)dt-\int\limits_0^x\overline{u}(t)\cos(2nt)dt+\\
+\frac{1}{2\pi n}\int\limits_0^\pi(\pi-t)(u_{\mathcal{R}}^2(t)-u_{\mathcal{I}}^2(t)+4iu_{\mathcal{R}}(t)u_{\mathcal{I}}(t))\sin(2nt)dt-\frac{1}{2n}\int\limits_0^x\overline{u}^2(t)\sin(2nt)dt\Bigg)+\\
+\sqrt{\frac{2}{\pi}}x\cos(nx)\Bigg(-\frac{1}{\pi}\int\limits_0^\pi\overline{u}(t)\sin(2nt)dt+\frac{1}{2\pi n}\int\limits_0^\pi\overline{u}^2(t)\cos(2nt)dt-\\
-\frac{2}{\pi}\int\limits_0^\pi\int\limits_0^t\overline{u}(t)\overline{u}(s)\cos(2nt)\sin(2ns)dsdt-\frac{1}{2\pi n}\int\limits_0^\pi\overline{u}^2(t)dt\Bigg)+\\
+\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cos(nx)\Bigg(\int\limits_0^x\overline{u}(t)\sin(2nt)dt+\frac{1}{2n}\int\limits_0^x\overline{u}^2(t)dt+2\int\limits_0^x\int\limits_0^t\overline{u}(t)\overline{u}(s)\cos(2nt)\sin(2ns)dsdt-\\
-\frac{1}{2n}\int\limits_0^x\overline{u}^2(t)\cos(2nt)dt\Bigg)+\widetilde{\rho}_n(x),\quad \textit{где } \{\|\widetilde{\rho}_n(x)\|_{C[0,\pi]}\}_1^\infty\in l_1.
\end{aligned}
\tag{7}
$$

Доказательство. Для удобства будем обозначать через $\rho(x,\lambda)$ любую функцию, удовлетворяющую оценке $\sup\limits_{x\in[0,\pi]}|\rho(x,\lambda)| < M\Upsilon^2(\lambda)$, где M не зависит от λ, а $\lambda\to\infty$ внутри некоторой полуполосы Π_α. Будем обозначать через ρ_n любую последовательность из пространства l_1, а через $\rho_n(x)$ — любую функцию, для которой $\left\{\|\rho_n(x)\|_{C[0,\pi]}\right\}_1^\infty\in l_1$. Тогда в силу утверждений 2 – 4, для любого $\lambda\in\Pi_\alpha$ имеем

$$
\omega(x,\lambda)=\sin(\lambda^{1/2}x)\left(1-a(x,\lambda)-\frac{1}{2}\lambda^{-1/2}B(x,\lambda)\right)+\cos(\lambda^{1/2}x)\upsilon(x,\lambda)+\rho(x,\lambda).
\tag{8}
$$

Далее, согласно (5), $\lambda_n^{-1/2}=n^{-1}+\rho_n$,

$$
\sin(\lambda_n^{1/2}\xi)=\sin(n\xi)+\mu_n\xi\cos(n\xi)+\rho_n(\xi),\quad \cos(\lambda_n^{1/2}\xi)=\cos(n\xi)-\mu_n\xi\sin(n\xi)+\rho_n(\xi).
$$

Тогда

$$
b(x,\lambda_n)=\int\limits_0^x u(t)\sin(2\lambda_n^{1/2}t)dt=b_{2n}(x)+\mu_n a_{2n}(x)=b_{2n}(x)+\rho_n(x);
$$

$$
a(x,\lambda_n)=\int\limits_0^x u(t)\cos(2\lambda_n^{1/2}t)dt=a_{2n}(x)-\mu_n b_{2n}(x)=a_{2n}(x)+\rho_n(x);
$$

$$\frac{1}{2}\lambda_n^{-1/2}\int\limits_0^x u^2(t)\sin(2\lambda_n^{1/2}t)dt = \frac{1}{2n}B_{2n}(x) + \rho_n(x);$$

$$\frac{1}{2}\lambda_n^{-1/2}\int\limits_0^x u^2(t)\cos(2\lambda_n^{1/2}t)dt = \frac{1}{2n}A_{2n}(x) + \rho_n(x);$$

$$\mathrm{w}(x,\lambda_n) = \int\limits_0^x\int\limits_0^t u(t)u(s)\sin(2\lambda_n^{1/2}s)\cos(2\lambda_n^{1/2}t)dsdt = \mathrm{w}_{2n}(x) + \rho_n(x).$$

Подставляя эти разложения в (8), получим

$$\omega(x,\lambda_n) = \sin(nx)\left(1 - a_{2n}(x) - \frac{1}{2n}B_{2n}(x)\right) + \\ + x\cos(nx)\left(-\frac{b_{2n}}{\pi} + \frac{A_{2n}}{2\pi n} - \frac{2\,\mathrm{w}_{2n}}{\pi} - \frac{U(\pi)}{2\pi n}\right) + \\ + \cos(nx)\left(b_{2n}(x) + \frac{U(x)}{2n} + 2\,\mathrm{w}_{2n}(x) - \frac{A_{2n}(x)}{2n}\right) + \rho_n(x).$$

Остаётся нормировать эти собственные функции. Для этого вычислим $\|\omega(x,\lambda_n)\|$:

$$\int\limits_0^\pi \omega(x,\lambda_n)\overline{\omega(x,\lambda_n)}dx = \int\limits_0^\pi \sin^2 nxdx - 2\,\mathrm{Re}\int\limits_0^\pi \sin^2(nx)(a_{2n}(x) + \frac{1}{2n}B_{2n}(x))dx - \\ - \mathrm{Re}\int\limits_0^\pi \sin(2nx)(-\frac{x}{\pi}\upsilon_{2n}(\pi) + \upsilon_{2n}(x))dx + \rho_n = \\ = \frac{\pi}{2} - \int\limits_0^\pi (\pi - x)u_{\mathcal{R}}(x)\cos(2nx)dx - \frac{1}{2n}\int\limits_0^\pi (\pi - x)(u_{\mathcal{R}}^2(x) = u_{\mathcal{I}}^2(x))\sin(2nx)dx + \rho_n.$$

Отсюда сразу же следует формула (6).Теперь найдём асимптотические формулы для векторов биортогональной системы. Поскольку асимптотически все собственные значения просты, имеем $\mathrm{v}_n(x) = \frac{\overline{y_n}}{(y_n,\overline{y_n})}$. Заметим, что

$$(y_n,\overline{y_n}) = \int\limits_0^\pi y_n^2(x) = 1 - \frac{2i}{\pi}\int\limits_0^\pi (\pi - x)u_{\mathcal{I}}(x)\cos(2nx)dx - \frac{2i}{\pi n}\int\limits_0^\pi (\pi - x)u_{\mathcal{R}}(x)u_{\mathcal{I}}(x)\sin(2nx)dx + \rho_n,$$

откуда получаем формулу (1). ☐

Список литературы

[1] Савчук А.М., Шкаликов А.А. // Операторы Штурма–Лиувилля с сингулярными потенциалами, Матем. Заметки., 1999, V.66, No. 6, P. 897–912.

[2] Савчук А.М., Шкаликов А.А. // Операторы Штурма–Лиувилля с потенциалами – распределениями, Труды Московского матем. общества, V. 64 (2003), P. 159–219.

[3] Savchuk A.M., Shkalikov A.A. // Inverse problem for Sturm–Liuville operators with distribution potentials: Reconstruction from two spectra//, Russian Journal of Math. Physics, V.12(2005), 507–514.

[4] Садовничая И.В. // Равносходимость разложений в ряды по тригонометрической системе и по собственным функциям оператора Штурма–Лиувилля с потенциалом из пространства Соболева $W_2^{-1}[0, \pi]$, препринт.

[5] Келдыш М. В. О собственных значениях и собственных функциях некоторых классов несамосопряженных уравнений // ДАН СССР, 1951, Т. 77, №1, С. 11-14.

[6] Наймарк М. А. Линейные дифференциальные операторы. М. Наука, 1969.

[7] Марченко В. А. Операторы Штурма-Лиувилля и их приложения. Киев: Наукова думка, 1977.